



## Lakossági felmérés a képes egészségvédő feliratok magyarországi bevezetéséről

Kutatási gyorsjelentés

2009. május 14.

## BEVEZETÉS

Az **Országos Egészségfejlesztési Intézet** 2008 decemberében pályázatot írt ki a dohánytermékeken elhelyezendő képes egészségvédő feliratok tesztelésére. A projekt megvalósítására a Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete kérdőíves felmérést készített.

A képes egészségvédő feliratok a megelőzést, valamint a dohányzásról való leszokás elősegítését is szolgálják, ezért a kutatás két célcsoportra terjedt ki:

- a 18 év feletti dohányzó felnőtt lakosságra (400 fő), valamint
- a 12-18 év közötti általános iskolás és középiskolás diákokra (600 fő).

A felmérés e két célcsoportban vizsgálta a képes egészségvédő feliratok bevezetésével kapcsolatos véleményeket és tesztelte a bevezetésre szánt képeket.

Az adatfelvételre 2009 áprilisában került sor.

## A LEGFONTOSABB ELŐZETES EREDMÉNYEK

A következő táblázatok a felnőttek és a diákok válaszai alapján kialakult eredményeket tartalmazzák. Mindkét célcsoport esetében a képek két csoportja különíthető el:

1. A képek azon csoportja, amelyek megítélése az adott célcsoportban egyértelmű, azaz a válaszok alapján egyértelműen kiválasztható a **legjobb –leginkább figyelemfelkeltő és leghatásosabbnak ítélt** – kép (lásd a táblázatok első, „Domináns módon elkülönült képek” oszlopát);

2. A képek azon csoportja, amelyek megosztották a célcsoportokat, azaz nem különült el domináns módon egyik kép sem a három közül. Ennek ellenére az adatok alapján a képes egészségvédő feliratok e csoportja esetében is kiválasztható a „legjobb” kép (lásd a táblázatok második oszlopát).

### Módszertani megjegyzések:

A táblázatban a figyelemfelkeltő jelleget és a hatásosságot együttesen kezelő értékek találhatóak. **Minél magasabb ez az érték, annál figyelemfelkeltőbbnek és hatásosabbnak tartják a válaszadók az adott képeket.**

## A felnőtt célcsoportban végzett vizsgálat legfontosabb eredményei

Domináns módon elkülönült képek	A közvéleményt megosztó képek
 <p>5. <u>Állítás:</u> A dohányzás lassú, fájdalmas halálhoz vezethet (6,21)</p>	 <p>6. <u>Állítás:</u> A dohányzás a bőr öregedését okozza (4,95)</p>
 <p>2. <u>Állítás:</u> A dohányzás elzárja a vérereket, szívinfarktust és agyvérzést okoz (6,00)</p>	 <p>12. <u>Állítás:</u> A dohányzás abbahagyása csökkenti a súlyos tüdő és szív-megbetegedések veszélyét (4,89)</p>
 <p>9. <u>Állítás:</u> A dohányzás benzolt, nitrózaminokat, formaldehidet és hidrogén-cianidot tartalmaz (6,00)</p>	 <p>13. <u>Állítás:</u> Orvosa vagy gyógyszerésze segíthet a dohányzásról való leszokásban (4,78)</p>
 <p>14. <u>Állítás:</u> Kérjen segítséget a leszokáshoz (5,82)</p>	 <p>7. <u>Állítás:</u> A dohányzás károsítja az ivarsejteket és csökkenti a termékenységet (4,70)</p>
 <p>3. <u>Állítás:</u> A dohányzás halálos tüdőrákot okoz (5,64)</p>	
 <p>8. <u>Állítás:</u> A dohányzás csökkentheti a véráramlást, és impotenciát okoz (5,36)</p>	
 <p>11. <u>Állítás:</u> Védd a gyermekeket: ne kelljen dohányfüstöt belélegezniük (5,27)</p>	
 <p>10. <u>Állítás:</u> A terhes nők dohányzása árt a babának (5,26)</p>	
 <p>1. <u>Állítás:</u> A dohányosok általában fiatalabban halnak meg (5,25)</p>	
 <p>4. <u>Állítás:</u> A dohányzás súlyos függőséghez vezet. Ne kezdje el (4,86)</p>	

## A diák célcsoportban végzett vizsgálat legfontosabb eredményei

Domináns módon elkülönült képek	A diákok véleményét megosztó képek
 <p><u>2. Állítás:</u> A dohányzás elzárja a vérereket, szívinfarktust és agyvérzést okoz (6,46)</p>	 <p><u>6. Állítás:</u> A dohányzás a bőr öregedését okozza (4,94)</p>
 <p><u>5. Állítás:</u> A dohányzás lassú, fájdalmas halálhoz vezethet (6,33)</p>	 <p><u>12. Állítás:</u> A dohányzás abbahagyása csökkenti a súlyos tüdő és szív-megbetegedések veszélyét (4,61)</p>
 <p><u>9. Állítás:</u> A dohányzás benzolt, nitrozaminokat, formaldehidet és hidrogén-cianidot tartalmaz (6,18)</p>	 <p><u>13. Állítás:</u> Orvosa vagy gyógyszerésze segíthet a dohányzásról való leszokásban (4,36)</p>
 <p><u>3. Állítás:</u> A dohányzás halálos tüdőrákot okoz (5,89)</p>	 <p><u>7. Állítás:</u> A dohányzás károsítja az ivarsejteket és csökkenti a termékenységet (4,28)</p>
 <p><u>14. Állítás:</u> Kérjen segítséget a leszokáshoz (5,49)</p>	 <p><u>8. Állítás:</u> A dohányzás csökkentheti a véráramlást, és impotenciát okoz (4,21)</p>
 <p><u>10. Állítás:</u> A terhes nők dohányzása árt a babának (5,35)</p>	
 <p><u>1. Állítás:</u> A dohányosok általában fiatalabban halnak meg (5,01)</p>	
 <p><u>11. Állítás:</u> Védd a gyermekeket: ne kelljen dohányfüstöt belélegezniük (4,90)</p>	
 <p><u>4. Állítás:</u> A dohányzás súlyos függőséghez vezet. Ne kezdje el (4,60)</p>	